

Anti Fly

WP

بودر مگسی کشی

برسودا

BER SUDA

کمکهای اولیه:

- ۱- در صورت مسمومیت بیمار را به مرکز درمانی انتقال دهید.
- ۲- اگر وارد چشم شود ، چشمها را باز نگه داشته و ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با آب تمیز شستشو دهید.
- ۳- اگر خورده شود با خوراندن آب نمک نیم گرم و یا محلول پرمنگنات او را وادار به استفراغ نمایید.
- ۴- علائم مسمومیت : سردرد ، سرگیجه ، عدم تعادل لرزش ، تشنج
- ۵- پادرزه: پادرزه اختصاصی ندارد. درمان از روی علائم بالینی انجام شود.

احتیاطات:

- ۱- دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی قرار دهید.
- ۲- از قراردادن سم در نزدیکی مواد غذایی خودداری کنید.
- ۳- پس از استفاده دستهای را به طور کامل با آب و صابون بشویید.
- ۴- قلروف پسماند: از استفاده مجدد قلروف خالی جدا خودداری شود.



طریقه مصرف:

- ۱- روش اسپری: مقدار ۵۰۰ گرم پودر برسودا در ۵ لیتر آب گرم حل کرده و اطراف درب و پنجره ها و محل استراحت مگس ها اسپری نمایید. دقت کنید که سمپاش کاملا تمیز بوده و با سم دیگری آغشته نباشد.
- ۲- نشانه گذاری باقلم مو: مقدار ۱۰۰ گرم پودر برسودا را در ۱۰۰ میلی لیتر آب گرم حل کنید (نسبت یک به یک). سپس هم بزنید تا پودر در آب بطور کامل حل شود. مخلوط حاصل شده را توسط قلم مو در محل تجمع مگس ها (مانند لبه پنجره ها، دیوارها، ستون های محافظ ساختمان) بمالید. توجه داشته باشید این مخلوط دور از دسترس طیور، دام و حیوانات اهلی باشد. تمامی ترکیب را در یک نوبت مصرف کنید و در صورت نیاز مجدد دوباره اقدام به ساختن مخلوط جدید کنید.
- ۳- مقدار ۲۰۰ گرم از پودر را داخل ۴۰۰ سی سی آب حل نموده و در قلروف یا بشتابی ریخته و در محل تجمع مگسها قرار دهید.